


除菌したら
ニオイも
消えた

これ1本で
除菌も消臭も！

ニオイは 見えない バイキン？



気になるところ。
気になるときに。



タクシーやバス等 乗り物の清掃時に

乗車後の
気になるニオイに。



いつも清潔に保てます。

汚物処理時に トイレまわりに

汚物の処理時、
トイレ後のニオイ対策に。



瞬間的な消臭効果を発揮します。

車いす等の 介護器具まわりに

車いす等の
汚れが原因のニオイに。



樹脂・金属への影響は殆ど認められません。
※水と同等レベルの影響

ベッドまわりに

部屋のこもったニオイに。
枕や寝具のニオイ対策にも。



シミになりにくく影響は殆ど認められません。
※水と同等レベルの影響



300mL
スプレー
タイプ

■製品サイズ(タテ×ヨコ×高さ)(cm) : 5.6φ×21.5cm ■1個当たり重量(g) : 353g ■梱包単位(入数) : 48本/12本 ■梱包サイズ(タテ×ヨコ×高さ)(cm) 48本 : 47×37×23cm / 12本 : 24×19×23cm ■1プッシュあたり噴射量 : 0.3mL(±0.1mL)



4L
ボトル
タイプ

■製品サイズ(タテ×ヨコ×高さ)(cm) : 12×20×26.5cm ■1個当たり重量(g) : 4,280g ■梱包単位(入数) : 4本(詰替用ノズル付) ■梱包サイズ(タテ×ヨコ×高さ)(cm) : 40×24×26.5cm



20L
バルク
タイプ

■1個当たり梱包サイズ(タテ×ヨコ×高さ)(cm) : 30×30×29.5cm ■1個当たり重量(g) : 22,500g ■梱包単位(入数) : 1個(詰替用ノズル付) ■梱包サイズ(タテ×ヨコ×高さ)(cm) : 30×30×29.5cm ■1箱あたり梱包重量 : 22,500g

一度使ったら手放せない!! マタタコロの実力とは?

医療関係者さまのご感想 ※あくまでも個人の感想です

- >サラッとしていて良い
- >アルコールの匂いがしなくて良い
- >乾燥後ベタつかない
- >刺激が少ない。
- >乾きが遅い
- >臭いがないので効果があるか不安

② 除菌

抗菌力評価試験データ


(国京都微生物研究所 検証)

5分後に細菌が減少しているのが確認できます。

●試験方法: マタタコロ10mLに10'の菌液

0.1mLを接種し、経時的に生菌数を測定

マタタコロ





① ウィルス除去

抗ウィルス試験データ

国立大学法人 東京医科歯科大学 検証

1分でウィルスが減少しているのが確認できます。


●試験方法: TCID₅₀法 反応時間1分



③ 消臭性能

消臭性試験データ

(財)日本紡績検査協会 検証



2時間後ニオイが減少!

④ 安全性

●各種検証機関

※1: 財団法人 日本食品分析センター ※2: 財団法人 衛生科学研究所
※3: 財団法人 日本バイオリサーチセンター
※4: 国立大学法人 東京医科歯科大学 ※5: 他社試験 ※6: 自社試験

マタタコロは様々な第三者検査機関における安全性試験の結果、極めて高い安全性が認証されました。

- | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
| ① 眼刺激性試験 ※1 | 無刺激 | ⑥ 復帰突然変異性試験 ※2 | 陰性であると判定 |
| ② 急性経口毒性試験 ※1 | 異常及び死亡例は認められない | ⑦ 連続皮膚刺激性試験 ※2 | 無刺激であると推察される |
| ③ ヒトパッチ試験 ※2 | 一次刺激性は認められなかった | ⑧ 細胞毒性評価試験 ※4 | 細胞毒性は認められない |
| ④ 染色体異常試験 ※3 | 染色体異常誘発性はない | ⑨ 樹脂成型品の浸漬参考試験 ※5 | 22品目で影響無し |
| ⑤ 皮膚感作性試験 (MT法) ※2 | 皮膚感作性がない | ⑩ 金属腐蝕試験 ※6 | 水と同等 |

各種安全性が認証!

※試験での結果であり実際の環境によって異なる場合がございます。

【使用上の注意】 1.用途以外に使用しないでください。 2.20cm以上近づけたり、一度にスプレーし過ぎたりしないでください。 3.直接吸い込んだり、顔に向けてスプレーしないでください。 4.毛、絹、皮製品など水洗い不可表示のあるもの、染め加工等の特殊加工されたものはシミや変色のおそれがあるのであらかじめ目立たない部位でお試してください。 5.高温及び直射日光を避け、暗所の涼しい所に密栓して保管ください。 6.小児の手の届かないところに保管してください。 7.万一目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流してください。 8.万一誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲んで吐き出してください。異常がありましたらすぐに医師にご相談ください。 9.他の薬剤、洗浄剤とは混ぜないでください。